

PSORIASI

- Dermatite eritemato-squamosa con ampie chiazze biancastre localizzate prevalentemente ai gomiti, ginocchia, regione sacrale e cuoio capelluto
- Non contagiosa!
- Predisposizione genetica
- Fenomeno dell'isomorfismo di Koebner (nuove lesioni di psoriasi su regioni precedentemente sane, successivamente allo sviluppo di una cicatrice dopo un trauma)

Si osserva peggioramento della psoriasi nel periodo premestruale, durante l'assunzione di estrogeni, con l'abitudine al fumo, e nei periodi stressati. Anche gli episodi infettivi, nei bambini soprattutto, scatenano la psoriasi.

Miglioramento si osserva invece con l'esposizione al sole e con i bagni in mare (eliobalneoesposizione)

Esistono varia forme cliniche:

- volgare: gomiti, ginocchia, lombo-sacrale, cuoio capelluto
- artropatica: artrite infiammatoria con o senza coinvolgimento cutaneo
- intertriginosa: a livello delle grandi pieghe (ascellari, sottomammarie, inguinali)









SEDI ANATOMICHE RISCHI DEL PIERCING

- Orecchio (cheloide)
- Naso (fistole, infezioni)
- Sopracciglio (lesione arteria temporale)
- Lingua e Labbro (danni ai denti)
- Ombelico (infiammazione/infezione)
- Genitali (danni)

FASI RIPARAZIONE TISSUTALE

- Fase INFIAMMATORIA
- Fase RIPARATIVA
- Fase della CICATRIZZAZIONE

Possono influenzare la cicatrizzazione l'età, la genetica, il fumo, l'uso di farmaci, il diabete, i deficit vitaminici

Trattamento della ferita da tatuaggio

- Irrigare con soluzione fisiologica sterile e usare garza sterile, tamponando senza strofinare
- Disinfettare (polivinil-pirrolidone-iodio, clorexidina, amuchina, acqua ossigenata)
- Applicare vaselina alba (anche prima di fare la doccia per rendere il tatuaggio semi-impermeabile)
- Non bendare, evitare bagni in piscina per una settimana, evitare esposizione solare, non staccare le croste

COMPLICANZE

- INFEZIONI
- ALLERGIE AI PIGMENTI (importante anamnesi di pregresse allergie e formazione di cicatrici patologiche)
- Granulomi da corpo estraneo (reazione cutanea di difesa nel tentativo di eliminare o isolare il materiale estraneo)
- Cicatrici patologiche: cheloidi e cicatrici ipertrofiche
- Per i piercing: danni ai tessuti

Trattamento della ferita da piercing

- Prima di ogni medicazione è indispensabile lavarsi le mani
- Disinfettare con prodotti a base di iodio e clorexidina (e prodotti similari)
- Asciugare con garze sterili
- Ruotare il gioiello ogni giorno per evitare aderenze
- Evitare esposizione solare, bagni in mare
- Monitorare infezioni e reazioni allergiche

LIMITI ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING

- Non si possono eseguire tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in altre parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad es. tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing dell'apparato genitale, palpebre e capezzolo)

E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenti invalidanti permanenti ai sensi dell' art. 5 del Codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa