

## Modalità uso prodotti larvicidi - 2008

disponibili presso le Farmacie della provincia di Reggio Emilia a prezzi "convenzionati"

### BIOLARKIM 14 (Bacillus Thuring.isr. - Reg. Min. Sal. n. 15615)



- conf. da 50 ml con contagocce
- Versare 42 gocce di "Biolarkim 14" in una bottiglia contenente 1,5 litro d'acqua
- mescolare bene e versare la soluzione così ottenuta in 10 tombini o sottovasi
- frequenza di intervento: **settimanale**

**2,50 euro/conf (IVA compr)**

### FLUBEX COMPRESSE (Diflubenzuron - Reg Min. Sal. 17520)



- 10 compresse da 2 grammi (diflubenzuron 2%)
- ogni compressa tratta fino a 40 litri acqua (anche con forte carica organica come ad esempio un tombino)
- collocare la compressa nell'acqua di ogni tombino o griglia di raccolta.
- frequenza di intervento: **ogni 14-21 giorni**



**3,50 euro/conf**

### FLUBEX FLOW 7 EC (Diflubenzuron - Reg.Min. Sal. 17521)



- flacone con dosatore da 50 ml - (diflubenzuron 7%)
- versare 5 gocce (pari a 0,25 ml) del prodotto in 1,5 litri d'acqua
- mescolare bene e versare la soluzione così ottenuta in max 10 tombini o sottovasi (circa un bicchiere di soluzione ognuno)
- frequenza di intervento: **ogni 15 giorni**

**5,50 euro/conf**

## Modalità uso prodotti larvicidi - 2008

Agg. del 8 aprile 2008

disponibili presso le Farmacie della provincia di Reggio Emilia a prezzi "convenzionati"

### Formulati in compresse



1. collocare una compressa in ogni tombino o raccolta di acqua non rimovibile
2. ogni pastiglia/compressa tratta fino a 40 / 50 litri di acqua
3. per ridurre i costi è possibile spezzarla e usarla su più tombini

Frequenza di intervento : ogni 14 — 21 giorni

### Formulati liquidi

1 Versare in una bottiglia contenente 1,5 litro d'acqua


2 Mescolare bene e versare la soluzione così ottenuta in 10 tombini o sottovasi (circa 150 ml di soluzione ciascuno)



42 gocce di BIOLARKIM 14

oppure

5 gocce di FLUBEX Flow 7 EC



Frequenza di intervento :

BIOLARKIM 14 : settimanale

FLUBEX Flow 7 EC : quindicinale

#### NOTE GENERALI

- Le indicazioni qui contenute sono fornite per facilitare l'impiego pratico dei prodotti ma non sostituiscono il contenuto delle etichette (che è quello registrato presso il Ministero della Salute).
- Fermo restando che la rimozione di ogni raccolta d'acqua (anche occasionale) previene lo sviluppo delle zanzare, i prodotti sopra riportati hanno azione larvicida, sono cioè efficaci per prevenire lo sviluppo delle larve di zanzara in quei ristagni idrici non rimovibili presenti nei cortili e giardini degli edifici di pertinenza privata (in particolare tombini per l'acqua piovana, scarichi pluviali, ecc.); utilizzarli in qualunque forma nei confronti degli adulti di zanzara è pertanto, oltre che vietato, del tutto inefficace ed inutile
- Il trattamento va fatto solo nei tombini dove ristagna l'acqua: all'asciutto le uova di zanzara tigre non possono schiudere
- È importante pulire periodicamente i pozzetti, eliminando i detriti (foglie, terra, ecc.): la presenza di materiale organico riduce l'efficacia dei prodotti
- Si dovranno ritrattare i pozzetti subito dopo ogni evento piovoso, o dopo l'immissione di acqua dovuta al lavaggio di cortili o autovetture
- Con i prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* isr. (BIOLARKIM 14) la morte delle larve di zanzara tigre avviene in tempi rapidi (entro poche ore dall'utilizzo del biocida). Con quelli a base di diflubenzuron (FLUBEX) l'effetto invece non è immediato poiché l'insetticida agisce interferendo sul meccanismo di sviluppo larvale: in questo caso pertanto, se sono stati rispettati i tempi e le diluizioni d'uso sopra riportate, la presenza di larve, nei giorni successivi ai trattamenti, non è indice di insuccesso dell'intervento larvicida
- Conservare i prodotti nelle confezioni originali, al riparo dalla luce ed in ambiente fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali
- Per motivi di sicurezza ed efficacia preparare i prodotti da utilizzare di volta in volta. Ridurre od aumentare proporzionalmente dosi e quantitativi di soluzione in acqua del larvicida se occorre trattare un numero di focolai (tombini e sottovasi) diverso da quello degli esempi sopra riportati.
- I prodotti sopra riportati sono quelli per i quali FCR conferma disponibilità e prezzi sino al 30 set 08 ed ha chiesto alle Farmacie private l'applicazione dello stesso prezzo massimo.