

كيفية إجراء الفحص

الأطفال الملتحقين بالحضانة يُجرى لهم اختبار البصر في المدرسة، وذلك بعد إخطار المدرسة نفسها للوالدين.

بالنسبة للأطفال غير المتعاونين في المدرسة والمتغيبين عنها، فسيُتلقى الوالدان خطاب دعوة أو سيحصلان مباشرةً على عناوين الاتصال الخاصة بالفحص من أجل التواصل مع مقيم البصر والحصول على الكشف الطبي في العيادات الطبية المحلية.

الأطفال غير المقيدون في الحضانات يُرسَل إليهم خطاب لدعوتهم إلى إجراء الاختبار مجانًا في العيادات الطبية بهيئة الوحدة الصحية المحلية.

يُستثنى من البرنامج الأطفال الذين يرتدون نظارات بالفعل.

نتيجة اختبار الفحص

إذا كانت نتيجة الفحص سلبية ولا يوجد غمش، يُسلَّم مقيم البصر التقرير الذي سيرضه الوالد على طبيب الأطفال المرجعي، مع توصيه بتكرار الكشف الطبي بعد عام أو في الصف الأول الابتدائي.

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ويوجد شك في الإصابة بالغمش، ينتقل الطفل إلى المستوى الثاني، عن طريق حجز كشف طبي لدى طبيب العيون من خلال المركز الموحد للحجز (تقويم بأمكان مخصصة). أثناء كشف طبيب العيون سيصف الطبيب ارتداء نظارة، إذا لزم الأمر، وقد يصف أيضًا علاجًا للغمش (وضع رقعة على العين السليمة)، وكذلك الفحوصات الدورية التالية.

الاتصال

البريد الإلكتروني الموثق: screeningortottico@pec.ausl.re.it

لمعرفة المزيد (مواد متعددة اللغات)

www.ausl.re.it/screening-ortottico

فحص تقويم البصر من أجل التشخيص المبك للغمش (العين الكسولة)



- كيفية العلاج
- ما المقصود بالغمش؟
- كيفية العلاج
- فحص تقويم البصر

ما المقصود بالغمش؟

الغمش، المعروف باسم «العين الكسولة»، هو انخفاض في القدرة البصرية لعين واحدة، ولا يمكن تصحيحه باستخدام النظارات أو وسائل مساعدة على الإبصار، وهو ينتج عن تطور البصر بصورة غير طبيعية في السنوات الأولى من العمر.

الأسباب الأكثر شيوعًا للغمش هي عيوب البصر (طول النظر أو اللابؤرية القرنية أو قصر النظر)، أو الحول أو أمراض العيون.

يمثل الغمش السبب الأكثر شيوعًا للإعاقات البصرية لدى الأطفال؛ ويمس 2-4% من الأطفال، وقد لا يمكن علاجه، إن لم يتم تشخيصه في أوقات تتيج حل هذه المشكلة من خلال علاجات هادفة.

فعليًا لا ينطوي الغمش على حدوث أي تحسن تلقائي، وإن لم يُعالج، قد يؤثر بالسلب في سن البلوغ على جودة الحياة، إضافة إلى أن البالغين المصابين بالغمش يكونون معرضين لخطر ضعف الرؤية والعمى، في حالة تعرض العين الأخرى لضرر دائم.

ومن هنا تأتي الأهمية الشديدة لفحص البصر في سن ما قبل المدرسة.

كيفية العلاج

قبل كل شيء يجب التشخيص في غضون سن 6 سنوات من العمر، أي خلال الفترة التي يكون فيها الجهاز البصري لدى الطفل مازال قابلاً للتعديل، ويمكنه التحسن عند تلقي العلاج المناسب.

علاج الغمش يعتمد على السبب والسن الذي تم فيه التشخيص. قد يُوصف ارتداء نظارة أو «علاج بالحجب»، أي علاج ينطوي على تغطية العين المسيطرة التي ترى جيدًا، من أجل التحفيز على تطوير بصر العين الأضعف بصورة سليمة، أي تحديدًا العين التي يُطلق عليها اسم «العين الكسولة».

فحص تقويم البصر في هيئة الوحدة الصحية المحلية في ريدجو إيميليا

في هيئة الوحدة الصحية المحلية في ريدجو إيميليا، يُجرى فحص تقويم البصر للوقاية من الغمش وتشخيصه مجانًا لجميع الأطفال الذين يبلغون من العمر 4 سنوات وقيّمون في المنطقة، ويجري الفحص على يد مقومات البصر في هيئة الوحدة الصحية المحلية لدى الحضانات، للأطفال الملتحقين، أو في العيادات الطبية للأطفال غير الملتحقين بالحضانة أو المتغيّبين عنها أو غير المتعاونين (العيادات الطبية موجودة في المناطق الست للإقليم في ريدجو إيميليا وكاستيلنوڤو ني مونتي وكورّيدجو وجواستالو ومونتيكيو وسكانديانو).

الكشف الطبي مجاني، وغير باضع، ويسغرق 10 دقائق تقريبًا.

ينقسم الفحص إلى مستويين:

المستوى الأول

اختبار فحص يجريه مقوم البصر داخل الحضانات بالتعاون مع الطاقم التربوي أو في العيادات الطبية المحلية للأطفال غير المتعاونين أو المتغيّبين أو الذين لا يلتحقون بالحضانة.

المستوى الثاني

كشف طبي يجريه طبيب العيون، وهو مخصص للحالات التي تكون نتيجتها إيجابية في فحص تقويم البصر.