



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Presidio Ospedaliero Arcispedale S. Maria Nuova

Dipartimento Neuromotorio e Riabilitativo

INFORMATIVA

INFORMATIVA SULLA TERAPIA DI DECOLONIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI POSITIVITA' DEL TAMPONE NASALE



Maggio 2023

Questa informativa è stata realizzata da:

Cristina Rimessi, Sonia Tarantola, Simona Lavorato, Ermanno Gabbi

Autorizzato da: Dott. Ettore Sabetta - *Direttore S.C. Ortopedia*

GENTILE SIGNORA/SIGNORE,

il tampone nasale per la ricerca dello staphylococcus aureus è risultato positivo. Questo germe non rappresenta un rischio per la sua salute, nè per quella dei suoi familiari, anche se fossero bambini.

Occorre tuttavia procedere alla decolonizzazione cutanea e delle mucose allo scopo di ridurre la concentrazione di batteri che rappresentano una possibile causa d'infezione post-operatoria.

Per la decolonizzazione procedere alle seguenti azioni:

**APPLICAZIONI DI MUPIROCINA NASALE
(BACTROBAN NASALE®) 2 VOLTE AL DI' PER 5 GG**

Applicare una piccola quantità di unguento nasale (approssimativamente della dimensione di una testa di fiammifero) sul dito mignolo o su un bastoncino di cotone e applicarla all'interno di ciascuna narice, sulla parte anteriore; quindi chiudere le narici facendo pressione sui due lati del naso e massaggiare delicatamente con il pollice e l'indice, allo scopo di distribuire uniformemente l'unguento nasale all'interno delle narici.

DURANTE I 5 GIORNI DI TRATTAMENTO

1. Bagno/doccia quotidiani con un sapone antisettico a base di Clorexidina al 4%, insistere strofinando per 2-3 minuti in modo particolare su ascelle, inguine, regione sottomammaria, perineo e ombelico prima di risciacquare. *(La clorexidina ha necessità di un tempo di contatto e di essere strofinata per non soffermarsi allo stato superficiale della cute ma penetrare nei follicoli piliferi).*
2. Shampoo il 1° e il 5° giorno con un sapone antisettico a base di Clorexidina al 4% e disinfezione con alcool di pettini e spazzole.
3. Sostituzione dello spazzolino da denti e sciacqui del cavo orale 3 volte al dì per 5 gg con Clorexidina collutorio *(disinfezione anche delle protesi, se presenti).*
4. Cambio quotidiano di indumenti, biancheria intima e asciugamani e lenzuola. Utilizzare preferibilmente saponi liquidi e sostituire stick deodorante, se in uso.

Per necessità contattare il personale dell'Ortopedia