

**Protocolli Ovaio/endometrio attivi al 18/03/2022**

<b>Protocollo</b>	<b>LINEA</b>	<b>PI</b>
<p><b><u>TRAMANT-01</u></b>            Studio di <b>fase II</b>: Mantenimento con trabectedina vs doxorubicina liposomiale (PLD) e trabectedina in pazienti con tumore all'ovaio ricorrente tra 6 e 12 mesi da trattamento con platino</p>	Mantenimento dalla seconda alla quarta linea	Dr.ssa Alessandra Bologna
<p><b><u>NEWTON</u></b>: “studio multicentrico in aperto, <b>fase II</b>, volto a testare un nuovo dosaggio personalizzato-radar di niraparib come terapia di mantenimento in pazienti con carcinoma dell'ovaio, tube di falloppio, o carcinoma peritoneale primario sensibili al platino.”</p>	MANTENIMENTO DOPO ALMENO 2 LINEE CON PLATINO	Dr.ssa Alessandra Bologna
<p><b><u>MIRASOL</u></b>            Studio randomizzato, in aperto, di <b>fase III</b> di mirvetuximab soravtansina rispetto alla chemioterapia prescelta dallo sperimentatore nel carcinoma ovarico epiteliale di alto grado avanzato, peritoneale primario e delle tube di falloppio, platino-resistente, con elevata espressione del recettore alfa del folato.</p>	Dalla II alla IV linea	Dr.ssa Alessandra Bologna