

ONDA
Reggio Emilia 22/04/2016
Le 4 stagioni della donna
Inverno


- G. Ghirardini
- La statica pelvica




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Arcispedale S. Maria Nuova

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





Il prolasso genitale femminile: i punti di rottura del prolasso anteriore



PROLASSO : terminologia

- Prolasso : abbassamento di un organo attraverso un canale naturale fino alla fuoriuscita all'esterno (dal latino tardo prolapsus – caduta in avanti)
- - cele: ernia (dal greco kele)
- (uretrocele, cistocele, isterocele, enterocele, rettocele)

Il prollasso genitale femminile: incidenza

- Prollasso asintomatico in postmenopausa(tutti i gradi):
- 41% in donne con utero, 38% in donne dopo isterectomia
- Prollasso sintomatico: dal 7% al 23%
- La maggior parte dei prollassi sono di 1° e 2° grado
- In < interventi chirurgici per prollasso in donne <50 anni e in > in donne > 50 anni

IL PROLASSO GENITALE FEMMINILE: CAUSE

- Le disfunzioni del pavimento pelvico sono in gran parte causate (per diverse ragioni) da un danno del tessuto connettivo contenuto nei suoi legamenti sospensori (fasce e legamenti)

Il prolasso genitale femminile: fattori di rischio

- Gravidanza
- parità
- parto vaginale
- parto strumentale
- lacerazioni
- taglio cesareo in travaglio
- taglio cesareo

Il prolasso genitale femminile: fattori di rischio

- Invecchiamento
- Metabolismo alterato del tessuto connettivo con riduzione del collagene
- Diminuzione di tono dei muscoli del pavimento pelvico (associazione fra prolasso e disfunzione neuromuscolare pelvica) (La riduzione dell'apporto di peptidi ai nervi dei muscoli perineali è la base delle anomalie nervose)

Il prolasso genitale femminile: fattori di rischio

- Lavori pesanti: fattore contribuente ma non principale
- Costipazione cronica: contribuisce progressivamente alla neuropatia e disfunzione
- Obesità: si associa a un aumento cronico della pressione addominale
- Patologie polmonari croniche: aumento della pressione addominale e riduzione del collagene
- Familiarità
- Anomalie congenite della sintesi di collagene


Il prollasso genitale femminile: sintomi

- Sintomi (senza perdita di funzione) :
- Dolore pelvico
- Senso di peso
- Cistiti recidivanti
- Bruciore genitale

- Sintomi (con perdita di funzione):
- Incontinenza urinaria
- Urgenza minzionale
- Defecazione ostruita
- Incontinenza fecale










Il prollasso genitale femminile: terapia

- Riabilitazione (condizioni lievi/medie) (esercizi di kegel, elettrostimolazione)
- Chirurgica:
- La restituzione della forma fornisce la restituzione delle funzioni

Berengario da Carpi



Il prollasso genitale femminile: terapia chirurgica

- - Non esiste ancora la terapia chirurgica ideale
- - Via vaginale
- - Via addominale
- - Le protesi
- - Il rigetto

Il pavimento pelvico

