

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**


Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Rete Ortopedica

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova

Dipartimento Neuromotorio e Riabilitativo



INFORMATIVA

PREPARAZIONE CUTANEA A DOMICILIO PER I PAZIENTI CANDIDATI AD INTERVENTO CHIRURGICO ORTOPEDICO

Hanno Collaborato:

Cristina Rimessi - Coordinatore Infermieristica Day Hospital Ortopedia

Sonia Tarantola - Coordinatrice Infermieristica Ortopedia Degenza

Simona Lavorato - Infermiera Day Hospital Ortopedia

Ermanno Gabbi, Dirigente Medico, S.C. Malattie Infettive

Autorizzato da: Dott. Ettore Sabetta - Direttore S.C. Ortopedia

GENTILE SIGNORA/SIGNORE,

studi condotti su vasta casistica hanno evidenziato che effettuare una disinfezione post doccia pre operatoria utilizzando un **prodotto a base di clorexidina** la sera prima dell'intervento e la mattina stessa, **PERMETTE DI RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI BATTERI CUTANEI** anche di 9 volte, riducendo di conseguenza il rischio di infezione post operatoria.

Per questo motivo è importante seguire le istruzioni sotto riportate.

LA SERA PRIMA DELL'INTERVENTO

- 1. Doccia e shampoo accurati con sapone detergente normalmente utilizzato.**
Insistere in modo particolare, per due-tre minuti, su ascelle, regione sottomammaria, ombelico, inguine e piedi. Asciugare con un telo pulito.
- Dopo l'asciugatura bagnare tutta la superficie cutanea tranne il capo (testa, faccia e mucose) e i genitali con un disinfettante a base di clorexidina in alcool aiutandosi con manopole o garze o pezzi in cotone o spugnetta purchè nuova. Iniziare dalla zona dell'intervento. *Disinfettare accuratamente anche le pliche cutanee se presenti.*
FONDAMENTALE: IL DISINFETTANTE DEVE ESSERE LASCIATO ASCIUGARE SPONTANEAMENTE (30-40 sec.).
3. Associare cambio di biancheria intima, abiti/pigiama, asciugamani e biancheria letto.

LA MATTINA DELL'INTERVENTO

Ripetere il punto 2:

Bagnare tutta la superficie cutanea tranne il capo (*testa, faccia e mucose*) e i genitali con un disinfettante a base di clorexidina in alcool aiutandosi con manopole o garze o pezzi in cotone o spugnetta purchè nuova. Iniziare dalla zona dell'intervento. *Disinfettare accuratamente anche le pliche cutanee se presenti.*

FONDAMENTALE: IL DISINFETTANTE DEVE ESSERE LASCIATO ASCIUGARE SPONTANEAMENTE (30-40 sec.)

Indossare biancheria e abiti puliti.

Per necessità contattare il personale dell'Ortopedia 0522/296332,
ore 13.00-14.00.