


Considerato il favorevole rapporto rischio/beneficio, la radiosinovioresi con ittrio-90 rappresenta una terapia locale appropriata per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da reumatismo infiammatorio cronico, in particolare in quelli con artrosi del ginocchio recidivante non responsiva alla terapia sistemica.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Dipartimento Medicina Specialistica

Reumatologia

RADIOSINOVIECTOMIA DEL GINOCCHIO



REGGIO EMILIA, OTTOBRE 2021

DESCRIZIONE

Si tratta di una procedura terapeutica con radioisotopi impiegata in Reumatologia in collaborazione con la Medicina Nucleare per il trattamento locale di infiammazioni croniche (*artrite reumatoide, artropatia psoriasica, spondilite anchilosante, spondiloartriti sieronegative e artrosinovite cronica in corso di osteoartrosi*).

La radiosinoviectomia può essere associata ad una terapia farmacologica a lungo termine, consentendo di bloccare l'infiammazione e prevenire la deformazione e il deterioramento delle articolazioni.

Qualsiasi articolazione può essere sottoposta a tale procedura. Al momento presso la nostra Unità Operativa viene effettuata solo a carico delle ginocchia.

CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni assolute ad eseguire tale procedura sono rappresentate da gravidanza e allattamento in atto, effusioni saccate (*versamenti circoscritti*), presenza di cisti di Baker e aree di osteonecrosi; controindicazioni relative sono invece l'uso in bambini, adolescenti, giovani adulti e pazienti con distruzione dell'osso intorno all'articolazione.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Al termine della procedura viene posizionata sul ginocchio una garza sterile e una fasciatura semirigida da mantenere per 2 giorni che viene rimossa in terza giornata.

In caso di complicazioni (*dolore, infiammazione locale, infezioni locali, arrossamento, ecc*) il paziente dovrà contattare il Reumatologo del Servizio.

La terapia può essere ripetuta nella stessa articolazione non prima di 6 mesi, su indicazione del reumatologo.

Per una buona riuscita del trattamento è indispensabile la stretta osservanza delle regole di somministrazione dell'ittrio 90 silicato.