




کولون-ریکٹم رسول کی چھان بین کی تشخیص اور احتیاطی تدبیر

میں

نمونہ لینے کی حدایت

- 1- فیکس کا نمونہ ایک صاف کٹینر میں لیں (مثال کے طور پر ایک پلاسٹک یا البومینیم کا)
- 2- بری ٹیوب کی اسکرؤ کھولیں اور چھڑ کو نکالیں، ایسا احتیاط برتیں تاکہ رقیق ٹیوب کے اندر نا گرے۔ یہ رقیق نمونہ کو محفوظ رکھتا ہے۔
- 3- 3 یا 4 الگ الگ جگہوں پر فیکس میں چھڑ کی بالکل نوک پر رگڑیں
- 4- چھڑ کی نوک میں جو فیکس بچ گیا ہو اسے جمع کریں۔ بہت سارا فیکس بیکار ہے اور یہ جمع کیا ہوا نمونے کو جانچ کیلئے استعمال کرنے کو ناممکن بناتا ہے۔
- 5- چھڑ کو ٹیوب کو اندر ڈالیں، اوپر کے حصے کو نیچے دباؤں جب تک کہ کلیک کی آواز آنے اور اسے بلائیں۔ رقیق کو تقریباً شفاف اور بہت مانع رہنا بہت ضروری ہے
- 6- مہیا کی ہوئی اینولپ میں فلاکس کو رکھیں اور جب تک اسے واپس نہ کیا جائے ریفریجریٹر میں رکھیں، جتنا جلد ممکن ہو اتنا جلد اور دیر سے دیر دو دن کے اندر یہ کرنا ضروری ہے



ENTRO AL MASSIMO DUE GIORNI DALLA RACCOLTA, IL CAMPIONE ANDRA' POSTO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE REFRIGERATO SITO PRESSO

جمع کرنے کے دیر سے دیر دو دن کے اندر، نیچے دی گئی جگہ پر ریفریجریٹر کے اندر رکھنا مناسب ہے

NB

- 1- فیکس جمع کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا کھانا کھائیں
 - 2- ماہواری کے دنوں یا جب خون بہنے کی بیماری کی وجہ سے خون بہتا ہے تب جانچ نہیں کرائیں
 - 3- فیکس کو پیشاب سے آلودہ ہونے سے بچائیں
 - 4- فلاکس کے باہری حصے کو اور بار کوڈ لیبل کو گیلا ہونے سے احتیاط برتیں
 - 5- ٹیوب اور لیبل کو ایلکوبل سے صاف نہیں کریں
 - 6- ٹیوب کی سطح پر ایلیومینیم فوائل کو خراب نہیں کریں
- ٹیوب کو تشخیص کیلئے استعمال کیا جاتا ہے: رقیق کو نہیں نکلیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں

ٹیوب کا استعمال ڈیوری ڈیٹ کے 6 مہینوں کے اندر کریں، ورنہ چھان بین مرکز کو فون کر کے ایک نیا ٹیوب حاصل کریں

چھان بین مرکز ٹیلیفون نمبر 0522-335327 پیر سے جمعہ تک، صبح 8.00 سے دوپہر 1.00 بجے کے درمیان -