



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

HERPES ZOSTER (Vaccino Shingrix)

Le manifestazioni dell'Herpes Zoster sono legate alla riattivazione del virus della varicella-zoster che è in grado di persistere dopo la prima infezione all'interno dei nervi periferici dove rimane in uno stato dormiente. Alcuni anni o decenni dopo aver contratto la varicella, la malattia (conosciuta comunemente come "fuoco di sant'Antonio") si manifesta con vescicole raggruppate a grappolo su una superficie arrossata e dolente, localizzate generalmente in una sola metà del corpo, lungo il percorso di un nervo.

La riattivazione del virus è favorita dall'età, da condizioni di immunosoppressione, dall'aver contratto la varicella in giovane età (prima dei 18 mesi). Nelle persone con sistema immunitario compromesso la riattivazione del virus può essere grave e diffusa. In alcuni casi il dolore nell'area colpita può prolungarsi oltre la guarigione delle lesioni (nevralgia post erpetica). Questo dolore è poco controllabile con i farmaci e può durare un anno o più. Altre complicanze temute si possono verificare in caso di coinvolgimento dell'occhio.

VACCINO

Contiene unità glicoproteiche di superficie del virus Herpes Zoster e si somministra in due dosi intervallate da almeno due mesi l'una dall'altra, per via intramuscolare. Può essere somministrato a partire dai 18 anni di età in persone che presentino determinate condizioni che aumentino il rischio di herpes zoster e di complicanze ad esso associate (patologie oncologiche, diabete, cardiopatie, malattie polmonari croniche, immunosoppressione, dialisi, HIV, trapianto di organo solido, trapianto di midollo).

CONDIZIONI CHE CONTROINDICANO L'USO DEL VACCINO

Non possono essere vaccinate le persone che abbiano avuto una reazione allergica severa ad una precedente dose o a un componente dello stesso vaccino. La somministrazione deve essere rinviata in caso di febbre.

EFFETTI COLLATERALI

Le reazioni sono soprattutto rossore, dolore e gonfiore nell'area della vaccinazione, mal di testa, brividi, febbre; meno frequentemente sintomi gastrointestinali.

Comunicare sempre al medico vaccinatore l'eventuale insorgenza di effetti collaterali.

Dato che ogni iniezione può causare reazioni e transitori cali di pressione arteriosa, a scopo cautelativo raccomandiamo alla persona vaccinata di restare nei pressi dell'ambulatorio per circa mezz'ora dopo la vaccinazione.

Reggio Emilia, marzo 2023

Fonti di riferimento : Pink Book (MMWR), scheda tecnica Shingrix, Circolare Regione Emilia Romagna
26/07/2021.0677728.U

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia: igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti: sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio: sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla: sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Sede Legale: Via Amendola,2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
C.F. e Partita IVA 01598570354
www.ausl.re.it