


In base alla valutazione del personale sanitario e ai risultati dell'ECG e degli esami del sangue sarete indirizzati:


- 1. A casa**, se viene escluso un dolore cardiaco e non ci sono fattori di rischio.
- 2. In OBI (osservazione breve internistica)**, se gli esami sono negativi ma ci sono altre malattie (es. diabete, ipertensione, ecc.) o altri fattori di rischio (fumo, obesità, ecc.), per ulteriori esami diagnostici e una eventuale prova da sforzo.
- 3. In AIC (alta intensità di cura)**, se ci sono modifiche N-STEMI nell'ECG (ST-sotto) e/o i marcatori degli enzimi cardiaci del sangue sono positivi, per la terapia farmacologica e per programmare una eventuale **coronarografia** (esame che permette di visualizzare le arterie coronarie del cuore).
- 4. In Emodinamica presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia**, se ci sono modifiche STEMI nell'ECG (ST-sopra) per una **coronarografia urgente** (esame che permette di visualizzare le arterie coronarie del cuore) e un'eventuale **angioplastica** (tecnica utilizzata per dilatare un tratto di arteria coronarica chiusa, tramite uno speciale catetere a palloncino inserito attraverso un'arteria periferica).



## IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

# DOLORE TORACICO



## IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO

## DOLORE TORACICO COME RICONOSCERLO?


Per **dolore toracico** si intende qualsiasi dolore avvertito nella zona del busto, sia davanti (zona tra la bocca e l'ombelico), sia dietro (schiena).

Le cause del dolore possono essere molto diverse.

Il **dolore toracico cardiaco** è, però, il più pericoloso ed è utile riconoscerlo per tempo.

Il **dolore toracico cardiaco** non scompare stando a riposo e dà una sensazione di schiacciamento, costrizione, pesantezza, tensione, gonfiore, senso di indigestione.

Di solito si avverte il disturbo nel petto, ma può essere sentito anche in corrispondenza dello stomaco (parte superiore dell'addome), del collo, della mandibola, della schiena, delle spalle e delle braccia.



## DOLORE TORACICO CARDIACO COSA FARE?

In caso di comparsa di dolore toracico cardiaco **mettersi a riposo per 5-10 minuti**.

**Se il dolore non passa, non aspettare!**

Il tempo è un fattore determinante.



**Mai guidare o mettersi in viaggio da soli.**

**Chiamare il 118 o farsi accompagnare direttamente al Pronto Soccorso più vicino.**



## COSA SUCCEDDE IN OSPEDALE



In ospedale viene eseguito un **elettrocardiogramma (ECG)**, un **prelievo di sangue** e una **valutazione medico-infermieristica**.

In **Pronto Soccorso** viene assegnato un codice colore (ROSSO - GIALLO - VERDE) a seconda della gravità dei sintomi.

In base alla valutazione del personale sanitario e ai risultati degli esami, il medico deciderà se potete essere dimessi o se è necessario un ricovero nel reparto adatto per proseguire il percorso diagnostico e terapeutico.

